

Maxicam 0,2% Solução Injetável

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos.
Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura, mínimas complicações gástricas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam	0,20 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Indicações:

Maxicam 0,2% é um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2), que confere um duplo benefício terapêutico, resultando em excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos de inflamação degenerativa do aparelho locomotor.

Maxicam 0,2% é indicado em processos inflamatórios gerais dos cães e gatos, tais como:

- **Patologias dolorosas ou degenerativas agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular:** osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femorais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, traumatismos e pós-operatório de artroplastias.
- **Afecções oculares:** uveítes, conjuntivites, pós-operatórios.
- **Desordens de ordem reprodutiva como retenção de placenta.**
- **Analgesia pré e pós-operatória.**

Modo de uso e dosagens:

Dosagem para cães:

Primeiro dia de tratamento	1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Segundo dia de tratamento em diante	0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Dosagem para gatos:

Tratamento em dose única	0,1 mL para cada 1 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
---------------------------------	---

O tratamento poderá ser continuado por até mais 5 dias consecutivos, na dose de 0,1 mL para cada 2 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal), a critério do médico-veterinário.

Maxicam 0,2% deve ser administrado uma vez ao dia ou a cada 24 horas pelas vias subcutânea, intramuscular ou intravenosa em cães e via subcutânea em gatos.

Duração do tratamento:

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e tipo de afecção a ser tratada. Nas patologias crônicas de cães, podem ser

necessários tratamentos prolongados por um período de até 28 dias ou a critério do médico-veterinário. Nestes casos, recomenda-se até duas aplicações consecutivas de **Maxicam 0,2%** e a

continuidade do tratamento com Meloxicam na forma de comprimidos (**Maxicam ou Maxicam Plus**).

Em gatos, uma única dose de **Maxicam 0,2%** é eficaz no controle da inflamação. Caso necessário e a critério do médico-veterinário, o produto é seguro para a continuidade do tratamento por até mais 5 dias consecutivos.

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides ou após o uso destes medicamentos.

Recomenda-se um período de 24 horas de intervalo entre um tratamento e outro ou de acordo com a farmacocinética do medicamento anteriormente utilizado.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Neomicina, Gentamicina e Kanamicina).

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos em razão do risco de toxicidade renal ser potencializado.

A segurança do medicamento não foi estabelecida em cadelas e gatas prenhes. O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada. Não administrar em gatos com idade inferior a 2 meses.

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de

administração indicadas para o uso do produto utilizando normas de assepsia próprias para aplicação parenteral.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico:

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans, e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberta a embalagem, utilizar o produto em até 06 meses.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000020 em 05/01/2006

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

 Atendimento
16 3518 2025

 Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



5000438Z (0720 OF00)

 **ourofino**
saúde animal