

# Maxicam Solução Oral

Uso Veterinário

## Anti-inflamatório à base de Meloxicam

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam ..... 0,1 g  
Excipiente q.s.p. .... 100,0 mL

### Indicações:

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), derivado do ácido enólico e pertence ao grupo dos Oxicans. Possui excelentes propriedades anti-inflamatórias, antipirética e analgésica. É considerado inibidor preferencial da COX-2, o que implica em menor risco de sangramento e danos gastrointestinais quando comparado aos

anti-inflamatórios não seletivos da COX-2.

**Maxicam Solução Oral** é indicado para o tratamento de quadros inflamatórios em cães e gatos.

**A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.**

### Modo de Uso e Dosagem:

Administrar o produto pela via oral na dosagem demonstrada na tabela abaixo, uma vez ao dia (a cada 24 horas), por no mínimo 4 dias consecutivos, devendo a duração do tratamento ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro.

	1º dia de tratamento	2º dia de tratamento em diante
Cães	0,2 mg/kg – equivalente a 0,2 mL/kg do produto <b>Maxicam Solução Oral</b>	0,1 mg/kg – equivalente a 0,1 mL/kg do produto <b>Maxicam Solução Oral</b>
Gatos	0,1 mg/kg – equivalente a 0,1 mL/kg do produto <b>Maxicam Solução Oral</b>	0,05 mg/kg – equivalente a 0,05 mL/kg do produto <b>Maxicam Solução Oral</b>

De acordo com os estudos de segurança realizados, o tratamento poderá ser prolongado por até 35 dias consecutivos em cães adultos e por até 21 dias consecutivos em gatos adultos. Para tratamento em cães e gatos filhotes (a partir de 2 meses de idade) pode ser indicada terapia por até 7 dias consecutivos.

A seringa que acompanha o produto atende ao tratamento de cães com até 10 kg. Para cães com peso acima de 10 kg a administração deverá ser feita em etapas ou com o auxílio de uma seringa comercial de maior volume.

### Precauções:

Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca do aplicador. Após administrar o produto, lavar as mãos com água e sabão.

Obedecer às dosagens recomendadas

para uso do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

### Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Achados de literatura indicam que o princípio ativo que compõe o produto pode causar vômito, diarreia e inapetência em alguns animais.

Nos estudos clínicos conduzidos com o produto, os animais tratados não apresentaram indícios de reações adversas ou efeitos colaterais após o uso do medicamento de acordo com as recomendações de bula.

### Antídotos:

Não há antídoto específico. O tratamento baseia-se na interrupção da terapia com o medicamento e no tratamento de suporte e sintomático.

### Interações Medicamentosas:

O uso concomitante com outros anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais pode agravar os efeitos colaterais dos AINEs.

O uso concomitante com aspirina pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal.

O uso concomitante com anticoagulantes pode aumentar o risco de sangramentos, bem como o uso juntamente com medicamentos que possuem potencial nefrotóxico pode potencializar o aparecimento de nefrotoxicidade.

O uso de AINEs com metotrexato pode acarretar toxicidade.

A dioxina pode aumentar os níveis séricos dos AINEs. Alguns AINEs podem reduzir os efeitos de inibidores da ECA sobre a pressão arterial e reduzir os efeitos de diuréticos como a furosemida.

### Advertências:

Seguir as orientações desta bula para utilização do produto.

### Contraindicações e Limitações de Uso:

Não utilizar em animais com úlcera gastrointestinal ativa ou quadros gastrointestinais acompanhados de

sangramento.

Utilizar com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos.

Usar com cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos.

Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade conhecida ao Meloxicam.

Não utilizar em filhotes com menos de 02 (dois) meses de idade.

Não foram realizados estudos de segurança em cadelas e gatas prenhes ou em fase de amamentação.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 04 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento e esterilidade.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 44/2020 em 07/04/2020.

### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofinosaudeanimal.com](http://www.ourofinosaudeanimal.com)  
Indústria brasileira

☎ 16 3518 2025



50004188/0420 CPFO

 **ourofino**  
saúde animal