

TABELA DE DOSES

ANTIMICROBIANOS

Azicox-2® (Azitromicina/Meloxicam)



50 mg	1º dia: 2 comp./5 kg SID 2º dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias
200 mg	1º dia: 2 comp./20 kg SID 2º dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias

Celesporin® (Cefalexina)



150 mg	1 comp./5 kg BID → 7 dias
600 mg	1 comp./20 kg BID → 7 dias

Doxifin® Comprimidos (Doxiciclina)



50 mg	1 comp./10 kg BID → 7 dias Erliquiose: mínimo 21 dias
100 mg	1 comp./20 kg BID → 7 dias Erliquiose: mínimo 21 dias
200 mg	1 comp./40 kg BID → 7 dias Erliquiose: mínimo 21 dias

Doxifin® Tabs (Doxiciclina)



50 mg	1 comp./5 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias
100 mg	1 comp./10 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias
200 mg	1 comp./20 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias

Enrotrat Tabs (Enrofloxacin)



25 mg	1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias
100 mg	1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias
200 mg	1 comp./40 kg SID → 3 a 5 dias

Trissulfin® SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)



400 mg	1º dia: 2 comp./5 kg SID 2º dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 21 dias Isosporose: 1 comp./2 kg SID → 5 a 14 dias
1600 mg	1º dia: 2 comp./20 kg SID 2º dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 21 dias Isosporose: 1 comp./8 kg SID → 5 a 14 dias

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)



1º dia:	1 mL/10 kg SID IV/SC/IM
2º dia:	0,5 mL/10 kg SID

Maxicam (Meloxicam)



Cães: 0,5 mg	1º dia: 2 comp./5 kg SID 2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias*
2,0 mg	1º dia: 2 comp./20 kg SID 2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias*
Gatos: 0,5 mg	1 comp./5 kg → até 4 dias

Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)



Cães: 0,5 mg	1º dia: 2 comp./5 kg SID 2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias*
2,0 mg	1º dia: 2 comp./20 kg SID 2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias*
Gatos: 0,5 mg	1 comp./5 kg → até 4 dias

Maxicam Tabs (Meloxicam)



Cães: 0,5 mg	1º dia: 2 comp./5 kg SID 2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias*
2,0 mg	1º dia: 2 comp./20 kg SID 2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias*
4,0 mg	1º dia: 2 comp./40 kg SID 2º dia: 1 comp./40 kg SID → 5 a 7 dias*
Gatos: 0,5 mg	1 comp./5 kg → até 4 dias

Prediderm Comprimidos (Prednisolona)



5 mg	1 comp./5 a 10 kg SID ou BID
20 mg	1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

*Até 28 dias: quadros crônicos.

DERMATOLÓGICOS

Aurigen® (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)



até 15 kg	- 4 gotas BID → durante 7 a 9 dias
acima 15 kg	- 8 gotas BID → durante 7 a 9 dias

Auritop® (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaína)



Cães	até 15 kg - 4 gotas BID → durante 7 a 10 dias acima 15 kg - 8 gotas BID → durante 7 a 10 dias
Gatos	3 gotas BID → durante 7 a 10 dias

Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)



Aerosol	7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas
Creme	7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas

Limp & Hidrat (Extrato de Aloe Vera/Extrato de Tilia/



Saponinas vegetais/Óleo essencial de Lavanda)

| Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana

TABELA DE DOSES

LINHA PROTEÇÃO

Herbalvet T.A.[®] (Cloreto de Benzalcônio 15%)

Diluir 1 mL para 500 mL de água (10 mL para 5 litros de água)

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)

Coleira - 48 cm | Cães de pequeno a médio porte*

Coleira - 63 cm | Cães de grande porte*

*Sugere-se um intervalo de troca, no mínimo, a cada 6 meses

NEOPet (Fipronil 12,5%)

Cães | até 10 kg - 0,67 mL → aplicar a cada 30 dias
10,1 a 20 kg - 1,34 mL → aplicar a cada 30 dias
20,1 a 40 kg - 2,68 mL → aplicar a cada 30 dias
acima de 40 kg - 4,02 mL → aplicar a cada 30 dias
Gatos | até 8 kg - 0,32 mL → aplicar a cada 30 dias

Protetor Pet (Dinotefuran 25%)

Cães | até 5 kg - 0,48 mL → aplicar a cada 30 dias
5,1 a 10 kg - 1,20 mL → aplicar a cada 30 dias
10,1 a 25 kg - 3,00 mL → aplicar a cada 30 dias
25,1 a 40 kg - 4,80 mL → aplicar a cada 30 dias
Gatos | até 5 kg - 0,48 mL → aplicar a cada 30 dias
acima de 5 kg - aplicar duas pipetas → aplicar a cada 30 dias

Top Dog[®] (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)

2,5 kg | 1 comp. p/ cada 2,5 kg*

10 kg | 1 comp. p/ cada 10 kg*

30 kg | 1 comp. p/ cada 30 kg*

*Recomenda-se dose de reforço: após 15 dias.

Giardíase: 3 dias consecutivos.

SEDATIVOS E ANESTÉSICOS

Cemtra[®] (Dextrocetamina/Midazolam/Tramadol)

1 mL/10 kg - via intramuscular

Propovet[®] (Propofol 1%)

Dose de indução sem M.P.A:

Cães | 0,73 a 0,93 mL/kg - via intravenosa

Gatos | 0,85 a 1,05 mL/kg - via intravenosa

Dose de indução com M.P.A:

Cães e Gatos | 0,2 a 0,6 mL/kg - via intravenosa → dose pode

variar de acordo com outros fármacos associados

Manutenção anestésica:

Cães | 0,04 mL/kg/min. - via intravenosa

Gatos | 0,03 mL/kg/min. - via intravenosa

SUPLEMENTOS

Biocanis (Lactobacillus acidophilus/Bifidobacterium animalis/

Enterococcus faecium)

Recém-nascido - 2 g → a cada 6 ou 12 horas

Adultos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

Partos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

Condromax[®] Pet Tabletes Palatáveis (Sulfato de

Condroitina A/Glicosamina/Cobre, Zinco e Manganês quelatos)

Até 10 kg - 1/2 tablete - SID → durante 30 dias

11 a 20 kg - 1 tablete - SID → durante 30 dias

21 a 30 kg - 2 tabletes - SID → durante 30 dias

Acima de 31 kg - 3 tabletes - SID → durante 30 dias

Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/

Vitaminas do Complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)

Cães e Gatos | 0,5 mL/kg BID → 15 a 30 dias

Aves e | 1 mL diluído em 100 mL de água BID →

Roedores | 15 a 30 dias

Metacell[®] Pet (Ácido Fólico, Vitaminas B2, B6, B12,

C, K3, Cobalto, Cobre, Ferro, Zinco, Açúcar Frutose e Sorbitol)

Cães e Gatos | 1 mL/10 kg BID → 15 a 30 dias

Aves e | 2 mL diluídos em 1 L de água → 15 a 30 dias

Roedores |

SID = 1 vez ao dia. BID = 2 vezes ao dia.

Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.