TABELA DE DOSES

Antimicrobianos

Azicox-2 (Azitromicina/Meloxicam)

50 mg	1° dia: 2 comp./5 kg SID 2° dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias
200 mg	1° dia: 2 comp./20 kg SID 2° dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias

Celesporin (Cefalexina)

150 mg	1 comp./5 kg BID → 7 dias
600 mg	1 comp./20 kg BID → 7 dias

Doxifin Tabs (Doxiciclina)

50 mg	1 comp./5 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias
100 mg	1 comp./10 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias
200 mg	1 comp./20 kg SID → 7 dias Erliquiose: mínimo 28 dias

Enrotrat Tabs (Enrofloxacina)

25 mg	1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias
100 mg	1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias
200 mg	1 comp./40 kg SID → 3 a 5 dias

Trissulfin SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)

400 mg	1° dia: 2 comp./5 kg SID 2° dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 21 dias Isosporose canina: 1 comp./2 kg SID → 5 a 14 dias
1600 mg	1° dia: 2 comp./20 kg SID 2° dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 21 dias Isosporose canina: 1 comp./8 kg SID → 5 a 14 dias

Suplementos

Biocanis (*Lactobacillus acidophillus/Bifidobacterium animalis* subs. *lactis/Enterococcus faecium*)

Recém-nascidos - 2 g → a cada 6 ou 12 horas
Adultos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas
Partos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

Condromax Pet (Sulfato de Condroitina/Glicosamina/Cobre, zinco e manganês quelatos)

Até 10 kg - ½ tablete - SID → durante 30 dias
11 a 20 kg - 1 tablete - SID → durante 30 dias
21 a 30 kg - 2 tabletes - SID → durante 30 dias
Acima de 31 kg - 3 tabletes - SID → durante 30 dias

Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/vitaminas do complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)

Cães e gatos	0,5 mL/kg BID → 15 a 30 dias
Aves e roedores	1 mL diluído em 100 mL de água BID → 15 a 30 dias

Metacell Pet (Ácido fólico, vitaminas B2, B6, B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)

Cães e gatos	1 mL/10 kg BID → 15 a 30 dias
Aves e roedores	2 mL diluídos em 1 litro de água → 15 a 30 dias

Ativi 40 mg (Colágeno Tipo II não desnaturado (UC-II®)/cobre/zinco/manganês e selênio)

1 comp./ independente do peso corporal do animal SID → durante no mínimo 60 dias
Recomenda-se que a administração ocorra 1 hora antes da alimentação do animal.

Linha Proteção

Herbalvet T.A. (Cloreto de Benzalcônio 15%)

Para inativação de bactérias e fungos:	Diluir 1 mL para 500 mL de água (10 mL para 5 litros de água)
Para inativação de cistos de *Giardia spp.*:	Diluir 1 mL para 700 mL de água (10 mL para 7 litros de água)
Para inativação do vírus da cinomose:	Diluir 1 mL para 1 litro de água (10 mL para 10 litros de água)

Para a desinfecção para mais de uma indicação prevista deve-se considerar a menor diluição dentre as indicações de interesse.

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)

Coleira - 48 cm	Cães de pequeno a médio porte Circunferência máxima: 38 cm
Coleira - 63 cm	Cães de grande porte Circunferência máxima: 53 cm

Idade mínima: 3 meses. Sugere-se um intervalo de troca a cada 6 meses no mínimo.

NEOPet (Fipronil 12,5%)

Cães	até 10 kg - 0,67 mL → aplicar a cada 30 dias 10,1 a 20 kg - 1,34 mL → aplicar a cada 30 dias 20,1 a 40 kg - 2,68 mL → aplicar a cada 30 dias acima de 40 kg - 4,02 mL → aplicar a cada 30 dias
Gatos	até 8 kg - 0,32 mL → aplicar a cada 30 dias

Top Dog (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)

2,5 kg	1 comp. p/ cada 2,5 kg
10 kg	1 comp. p/ cada 10 kg
30 kg	1 comp. p/ cada 30 kg

Recomenda-se dose de reforço após 15 dias.
Giardíase: 3 dias consecutivos.

Limp & Hidrat (Extrato de aloe vera/extrato de tília/saponinas vegetais/óleo essencial de lavanda)

Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana.

Anti-Inflamatórios e Analgésicos

Maxicam (Meloxicam)

Cães: 0,5 mg | 1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

2,0 mg | 1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias

Até 28 dias: quadros crônicos.

Gatos: 0,5 mg | 1 comp./5 kg → até 4 dias

Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)

Cães | 1° dia: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM
2° dia: 0,5 mL/10 kg SID. Por até mais 5 dias ou a critério do M.V.

Gatos | Dose única: 0,1 mL/ 1 kg/ SC

Maxicam Solução Oral (Meloxicam 0,1%)

Cães adultos (Até 35 dias) | 1° dia: 0,2ml/kg SID
2° dia: 0,1ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

Gatos adultos (Até 21 dias) | 1° dia: 0,1ml/kg SID
2° dia: 0,05ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

Cães e gatos filhotes: até 7 dias.

Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)

Cães: 0,5 mg | 1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

2,0 mg | 1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias

Até 28 dias: quadros crônicos.

Gatos: 0,5 mg | 1 comp./5 kg → até 4 dias

Prediderm Comprimidos (Prednisolona)

5 mg | 1 comp./5 a 10 kg SID ou BID
20 mg | 1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

Nulli (Tramadol 40 mg/mL)

Medicamento controlado com retenção obrigatória da notificação de receita (SIPEAGRO).

0,05 a 0,1 mL | kg/ TID

Duração do tratamento a critério do M.V.

Otológicos

Aurigen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

até 15 kg – 4 gotas BID → durante 7 a 9 dias
acima 15 kg – 8 gotas BID → durante 7 a 9 dias

Auritop (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaína)

Cães | até 15 kg – 4 gotas BID → durante 7 a 10 dias
acima 15 kg – 8 gotas BID → durante 7 a 10 dias

Gatos | 3 gotas BID → durante 7 a 10 dias

Dermatológicos

Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

Aerosol | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas
Creme | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas

Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosídeo)

Aplicar na área da ferida 3 vezes ao dia até completa cicatrização.

Não aplicar em feridas com sangramento ativo.

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, Óleo de Girassol nanoencapsulado, polissacarídeos e tensoativos)

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados, tecnologia mineral e tensoativos)

Aplicar quantidade desejada do produto nos pelo molhados do animal e massagear de forma a produzir espuma e cobrir toda a pele e pelagem. Aguardar por 5 a 10 minutos para proporcionar contato dos ingredientes com a pele e os pelos. Enxaguar abundantemente.

Uso tópico.

Bris Spray Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados e complexo vegetal)

Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada e tecnologia mineral)

Pulverizar o produto sobre a pelagem seca, no sentido contrário ao crescimento do pelo, de forma a cobrir com uma névoa do produto todo o corpo do animal. Não necessita enxágue.

Uso tópico. Agite antes de usar.

Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Ceramidas, Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada)

Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da pele e deposite a quantidade de produto, de acordo com o porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até seu limite final.

Uso tópico.

SID = 1 vez ao dia.
BID = 2 vezes ao dia.
TID = 3 vezes ao dia.
Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.
Consulte sempre a bula.

UC-II e UC-II® são marcas registradas da Lonza ou de suas afiliadas.

80004175/0920 OF06

ourofino saúde animal

ourofinopet.com