

TABELA DE DOSES

Antimicrobianos

Azicox-2 (Azitromicina/Meloxicam)



50 mg | 1º dia: 2 comp./5 kg SID
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias

200 mg | 1º dia: 2 comp./20 kg SID
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias

Celesporin (Cefalexina)



150 mg | 1 comp./5 kg BID → 7 dias

600 mg | 1 comp./20 kg BID → 7 dias

Doxifin Tabs (Doxiciclina)



50 mg | 1 comp./5 kg SID → 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

100 mg | 1 comp./10 kg SID → 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

200 mg | 1 comp./20 kg SID → 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

Enrotrat Tabs (Enrofloxacin)



25 mg | 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias

100 mg | 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias

200 mg | 1 comp./40 kg SID → 3 a 5 dias

Trissulfim SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)



400 mg | 1º dia: 2 comp./5 kg SID
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 21 dias
Isosporose: 1 comp./2 kg SID → 5 a 14 dias

1600 mg | 1º dia: 2 comp./20 kg SID
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 21 dias
Isosporose: 1 comp./8 kg SID → 5 a 14 dias

Anti-Inflamatórios e Analgésicos

Maxicam (Meloxicam)



Cães: 0,5 mg | 1º dia: 2 comp./5 kg SID
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

2,0 mg | 1º dia: 2 comp./20 kg SID
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias

Até 28 dias: quadros crônicos.

Gatos: 0,5 mg | 1 comp./5 kg → até 4 dias

Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)



1º dia: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM
2º dia: 0,5 mL/10 kg SID

Maxicam Solução Oral (Meloxicam 0,1%)



Cães adultos | 1º dia: 0,2ml/kg SID
Até 35 dias | 2º dia: 0,1ml/kg SID – 4 dias

Gatos adultos | 1º dia: 0,1ml/kg SID
Até 21 dias | 2º dia: 0,05ml/kg SID – 4 dias

Cães e gatos filhotes: até 7 dias.

Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)



Cães: 0,5 mg | 1º dia: 2 comp./5 kg SID
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

2,0 mg | 1º dia: 2 comp./20 kg SID
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias

Até 28 dias: quadros crônicos.

Gatos: 0,5 mg | 1 comp./5 kg → até 4 dias

Prediderm Comprimidos (Prednisolona)



5 mg | 1 comp./5 a 10 kg SID ou BID

20 mg | 1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

Nulli (Tramadol)



0,05 a 0,1 mL | por kg de peso corporal

Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Linha Proteção

Herbalvet T.A. (Cloreto de Benzalcônio 15%)

Diluir 1 mL para 500 mL de água
(10 mL para 5 litros de água)

Para inativação de cistos de *Giardia spp.*: Diluir 1 mL para 700 mL de água
(10 mL para 7 litros de água)

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)



Coleira - 48 cm | Cães de pequeno a médio porte

Coleira - 63 cm | Cães de grande porte

Sugere-se um intervalo de troca a cada 6 meses no mínimo.

NEOPet (Fipronil 12,5%)



Cães | até 10 kg - 0,67 mL → aplicar a cada 30 dias
10,1 a 20 kg - 1,34 mL → aplicar a cada 30 dias
20,1 a 40 kg - 2,68 mL → aplicar a cada 30 dias
acima de 40 kg - 4,02 mL → aplicar a cada 30 dias

Gatos | até 8 kg - 0,32 mL → aplicar a cada 30 dias

Top Dog (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)



2,5 kg | 1 comp. p/ cada 2,5 kg

10 kg | 1 comp. p/ cada 10 kg

30 kg | 1 comp. p/ cada 30 kg

Recomenda-se dose de reforço após 15 dias.

Giardíase: 3 dias consecutivos.

Limp & Hidrat (Extrato de aloe vera/extrato de tília/
saponinas vegetais/óleo essencial de lavanda)



Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana.

Dermatológicos

Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)



Aerosol | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas

Creme | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas

Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosídeo)



Aplicar na área da ferida 3 vezes ao dia até completa cicatrização.

Não aplicar em feridas com sangramento

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, Óleo de Girassol nanoencapsulado, polissacarídeos e tensoativos)



Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa

(Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados, tecnologia mineral e tensoativos)

Aplicar quantidade desejada do produto nos pelo molhados do animal e massagear de forma a produzir espuma e cobrir toda a pele e pelagem. Aguardar por 5 a 10 minutos para proporcionar contato dos ingredientes com a pele e os pelos. Enxaguar abundantemente.

Uso tópico.

Bris Spray Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados e complexo vegetal)



Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa

(Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada e tecnologia mineral)

Pulverizar o produto sobre a pelagem seca, no sentido contrário ao crescimento do pelo, de forma a cobrir com uma névoa do produto todo o corpo do animal. Não necessita enxágue.

Uso tópico. Agite antes de usar.

Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Ceramidas, Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada)



Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da pele e deposite a quantidade de produto, de acordo com o porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até seu limite final.

Uso tópico.

Otológicos

Aurigen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)



até 15 kg - 4 gotas BID → durante 7 a 9 dias

acima 15 kg - 8 gotas BID → durante 7 a 9 dias

Auritop (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaína)



Cães | até 15 kg - 4 gotas BID → durante 7 a 10 dias

acima 15 kg - 8 gotas BID → durante 7 a 10 dias

Gatos | 3 gotas BID → durante 7 a 10 dias

Suplementos

Biocanis (*Lactobacillus acidophilus/Bifidobacterium bifidum/Enterococcus faecium*)



Recém-nascidos - 2 g → a cada 6 ou 12 horas

Adultos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

Partos - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

Condromax Pet (Sulfato de Condroitina/Glicosamina/Cobre, zinco e manganês quelatos)



Até 10 kg - ½ tablete - SID → durante 30 dias

11 a 20 kg - 1 tablete - SID → durante 30 dias

21 a 30 kg - 2 tabletes - SID → durante 30 dias

Acima de 31 kg - 3 tabletes - SID → durante 30 dias

Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/vitaminas do complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)



Cães e gatos | 0,5 mL/kg BID → 15 a 30 dias

Aves e roedores | 1 mL diluído em 100 mL de água BID → 15 a 30 dias

Metacell Pet (Ácido fólico, vitaminas B2, B6, B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)



Cães e gatos | 1 mL/10 kg BID → 15 a 30 dias

Aves e roedores | 2 mL diluídos em 1 litro de água → 15 a 30 dias

Ativi 40 mg (Colágeno Tipo II não desnaturado (UC-II®)/cobre/zinco/manganês e selênio)



1 comp./ independente do peso corporal do animal SID → durante no mínimo 60 dias

Recomenda-se que a administração ocorra 1 hora antes da alimentação do animal.

SID = 1 vez ao dia.

BID = 2 vezes ao dia.

Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Consulte sempre a bula.

UCII e UC-II® são marcas registradas da Lonza ou de suas afiliadas.

