

Maxicam 0,2% Solução Injetável

Usos Veterinários

Anti-inflamatório não-esteróide para cães.
Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura,
sem complicações gástricas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam 0,20 g
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

Indicações:

Maxicam 0,2% é um anti-inflamatório não-esteróide com atividade inibidora seletiva da ciclooxigenase-2 (COX-2), que confere um duplo benefício terapêutico, resultando em excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos de inflamação degenerativa do aparelho

locomotor.

Maxicam 0,2% é indicado em processos inflamatórios dos cães, tais como:

- Patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femorais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, traumatismos e pós-operatório de artroplastias.
- Afecções oculares: uveítes, conjuntivites, pós-operatórias.
- Desordens de ordem reprodutiva como retenção de placenta.
- Metrites e mastites.
- Analgesia pré e pós-operatória.

Modo de uso e dosagens:

Dosagem para cães:

Primeiro dia de tratamento	1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Segundo dia de tratamento em diante	0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Maxicam 0,2% deve ser administrado uma vez ao dia ou a cada 24 horas pelas vias subcutânea, intramuscular ou intravenosa.

Duração do tratamento:

A duração do tratamento deverá ser

estipulada de acordo com a gravidade do quadro e tipo de afecção a ser tratada. Recomendam-se até duas aplicações consecutivas. Nas patologias crônicas dos cães, podem ser necessários tratamentos prolongados por um período de até 28

dias ou a critério do médico-veterinário. Nestes casos, recomenda-se a continuidade do tratamento com Maxicam (Comprimidos 0,5 mg) ou Maxicam (Comprimidos 2 mg).

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não-esteroides ou após o uso destas drogas. Recomenda-se um período de 24 horas de intervalo entre um tratamento e outro ou de acordo com a farmacocinética da droga anteriormente utilizada.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Neomicina, Gentamicina e Kanamicina). Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos em razão do risco de toxicidade renal ser potencializado.

A segurança do medicamento não foi estabelecida em cadelas prenhes.

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto utilizando normas de assepsia próprias para aplicação parenteral. O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo

médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico:

O Meloxicam é um anti-inflamatório não-esteróide da família dos oxicans, e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 9.195 em 05/01/06.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

 16 3518 2025



50003228/0918 OF00

 **ourofino**
saúde animal