

Maxicam 0,5 mg

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos.

Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam 0,5 mg
Excipiente q.s.p. 200,0 mg

Indicações:

Maxicam Comprimidos 0,5 mg é um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2). O bloqueio seletivo da COX-2, proporcionado pelo Meloxicam, confere um duplo benefício terapêutico, pois resulta em uma excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de

leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos. **Maxicam Comprimidos 0,5 mg** é indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femorais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos.

Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dosagem para cães:

Primeiro dia de tratamento	2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam / kg de peso corporal)
Segundo dia de tratamento em diante	1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam / kg de peso corporal)

Dosagem para gatos:

1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal).

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Nos casos agudos recomenda-se o tratamento por 05 a 07 dias. Nos quadros crônicos podem ser necessários tratamentos prolongados por um período máximo de 28 dias ou a

critério do médico-veterinário. Em gatos, o tratamento não deve ultrapassar 04 dias consecutivos.

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou

não esteroides ou imediatamente após o tratamento prolongado com estas drogas.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao Meloxicam. Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos. Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Não administrar em cadelas ou gatas prenhes no terço final da gestação ou em lactação.

Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite.

Reações adversas:

Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do Meloxicam são raros, no entanto, o médico-veterinário deve estar atento à possibilidade de ocorrência.

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico: o

Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.322 em 29/06/2007.

Apresentação:

Cartucho contendo um blíster com 10 ou 16 comprimidos, display contendo 6 ou 15 blisters com 10 comprimidos cada ou frasco plástico contendo 60 comprimidos.



Proprietário e fabricante:

Oufino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.oufinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

16 3518 2025

