

Azicox-2[®] (50 mg)

Uso Veterinário

Antibiótico e anti-inflamatório à base de Azitromicina e Meloxicam

Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:

Azitromicina 50,0 mg

Meloxicam 0,5 mg

Excipiente q.s.p. 200,0 mg

Indicações:

Azicox-2[®] (50 mg) é um produto que associa um antibiótico bactericida do grupo dos macrolídeos - a Azitromicina - e um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2) - o Meloxicam.

A Azitromicina é um antibiótico moderno que apresenta, além de um amplo espectro de ação, características farmacocinéticas que permitem altas concentrações intracelulares e prolongada permanência nos tecidos, proporcionando, assim, resultados terapêuticos com um período mais curto de tratamento.

O Meloxicam bloqueia seletivamente a COX-2, proporcionando atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes efeitos, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne

a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos.

Azicox-2[®] (50 mg) proporciona antibioticoterapia de amplo espectro, combatendo a causa das infecções, enquanto trata a inflamação e seus efeitos.

Azicox-2[®] (50 mg) é indicado no tratamento de afecções respiratórias (causadas por *Bordetella* spp, *Chlamydia* spp, *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp, *Shigella* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*), pele e anexos (causadas por *Corynebacterium* spp, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp, *Pausterella multocida*), urogenitais (*Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*), digestivas (diarreias causadas por *Escherichia coli*), orais (gengivites e periodontites) e artrite, osteomielite e discoespondilite (*Escherichia coli*). No pós-operatório de artroplastias, cirurgias ósseas, cirurgias ortodônticas, tratamentos ou profilaxias da doença periodontal e traumatismos em geral de cães e gatos.

Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido na dosagem demonstrada na tabela abaixo, uma vez ao dia.

Azicox-2[®] (50 mg)	Dosagem para cães e gatos
	1º DIA DE TRATAMENTO 2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal* 2º DIA DE TRATAMENTO EM DIANTE 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal**

*Dose equivalente a 20 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,2 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

**Dose equivalente a 10 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,1 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

Intervalo entre doses:

Azicox-2® (50 mg) deve ser administrado uma vez ao dia.

Duração do tratamento:

Para a maioria das afecções é recomendado de três a cinco dias consecutivos de tratamento, podendo este período ser ajustado de acordo com o quadro clínico e orientação do médico-veterinário.

As piodermites profundas podem necessitar de um período maior de terapia.

Não é recomendado período de tratamento superior a 5 dias para gatos. Independente do quadro clínico o tratamento deverá ser realizado até 48 horas após o desaparecimento da sintomatologia clínica.

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto. O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite.

Interações medicamentosas e contraindicações:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides, ou após o tratamento com estas drogas.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

A Azitromicina pode aumentar os níveis de carbamazepina, ciclosporina e digoxina por interferir no metabolismo destas substâncias.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina ou a aspirina.

Não administrar com antiácidos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Não administrar em cadelas ou gatas prenhes no terço final da gestação ou em lactação.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento. Podem ocorrer casos raros de choque anafilático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9284 em 20/03/2007.

Apresentação:

Cartucho com 6 comprimidos.



Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330 km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

www.ourofino.saudeanimal.com

Indústria brasileira

 16 3518 2025

