

Doxifin[®] Comprimidos 50 mg

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido solúvel de 250 mg contém:

Doxiciclina (Doxiciclina Hiclato) ... 50 mg
Excipiente q.s.p. 250 mg

Informações gerais:

A Doxiciclina é um antibiótico da família das tetraciclinas com algumas particularidades que a diferenciam das outras moléculas congêneres. Possui absorção oral elevada, cerca de 95%, com meia-vida plasmática prolongada, de aproximadamente 18 a 24 horas, necessitando, portanto, de dosagens diárias menores que outras tetraciclinas. A presença de alimento no estômago não interfere na absorção da Doxiciclina. Possui excelente distribuição e penetração na maioria dos líquidos e tecidos orgânicos. Apresenta o mais alto grau de lipossolubilidade entre todas as tetraciclinas, o que facilita a penetração direta da droga ativa através da dupla camada lipídica dos agentes infecciosos, atingindo inclusive algumas cepas resistentes a outras tetraciclinas. Atua inibindo a síntese proteica dos agentes etiológicos sensíveis.

A Doxiciclina não se acumula significativamente na circulação de animais com insuficiência renal. Por conseguinte, constitui a mais segura das tetraciclinas no tratamento de infecções extrarrenais nesses animais.

A Doxiciclina é excretada nas fezes, em grande parte como conjugado inativo, ou talvez, como quelato; por esse motivo, seu impacto sobre a microflora intestinal é relativamente menor.

Os comprimidos são solúveis em líquidos, visando à facilidade da administração por via oral, que pode ser como comprimido ou suspensão.

para o tratamento de diversas enfermidades que acometem os cães e gatos, causadas pelos seguintes agentes etiológicos sensíveis à Doxiciclina:

Para cães:

Infecções respiratórias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Mycoplasma* spp)

Infecções urinárias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*)

Anaplasmoze: (*Anaplasma* spp)

Erliquiose canina: (*Ehrlichia canis*)

Leptospirose: (*Leptospira* spp)

Pododermatite: (*Fusobacterium* spp, *Staphylococcus* spp)

Diarreias e gastroenterites: (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp)

Tétano: (*Clostridium tetani*)

Otite: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Pasteurella multocida*)

Feridas infectadas e pós-operatórias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*)

Para gatos:

Infecções respiratórias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Mycoplasma* spp)

Infecções urinárias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*)

Leptospirose: (*Leptospira* spp)

Pododermatite: (*Fusobacterium* spp, *Staphylococcus* spp)

Diarreias e gastroenterites: (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp)

Tétano: (*Clostridium tetani*)

Otite: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Pasteurella multocida*)

Feridas infectadas e pós-operatórias: (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*)

Indicações:

Doxifin[®] Comprimidos 50 mg é indicado

Modo de uso e dosagens:

Doxifin[®] Comprimidos 50 mg deve ser

administrado pela via oral, na dosagem:

Doxifin® Comprimidos	Peso corporal
1 comprimido de 50 mg	10 kg

ou seja, 5 mg de Doxiciclina por kg de peso, administrado a cada 12 horas, durante 7 dias consecutivos ou a critério do médico-veterinário.

Os comprimidos podem ser administrados junto com alimentos ou dissolvidos em líquidos.

Recomendamos a continuidade do tratamento por até 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Precauções:

Obedecer às dosagens indicadas para o uso do produto.
Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.
Se houver disfunção renal, as doses devem ser reduzidas para evitar acúmulo sistêmico excessivo.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar a fêmeas prenhes.
Não administrar a animais com menos de 30 dias de idade.
Não administrar o produto com prazo de validade vencido.

Interações medicamentosas:

Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com barbitúricos ou fenitoína.
A absorção da Doxiciclina pode ser afetada na presença de hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, sais de cálcio e de magnésio e preparações de ferro.
Não administrar junto com antiácidos.
A interação com sais de cálcio pode inibir o crescimento dos ossos e desenvolvimento dos dentes.

Efeitos adversos:

O tratamento prolongado pode causar distúrbios gastrointestinais, como náusea,

vômitos e diarreias; que podem ser minimizados pela administração do produto junto com alimentos. A presença de alimentos no estômago não prejudica a absorção da Doxiciclina.
Devido à capacidade que a Doxiciclina tem de se ligar com o cálcio, pode provocar arritmias cardíacas.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta (entre 15°C e 30°C), fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 7.075 em 20/08/99.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Apresentações:

Cartucho contendo um blíster com 14 comprimidos, cartucho contendo 3 blísteres com 14 comprimidos, display contendo 5 blísteres com 14 comprimidos e display contendo 10 blísteres com 14 comprimidos.



Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

☎ 16 3518 2025

