

Azicox-2[®] (200 mg)

Usos Veterinários

Antibiótico e anti-inflamatório à base de Azitromicina e Meloxicam

Fórmula:

Cada comprimido contém:

Azitromicina 200,0 mg

Meloxicam 2,0 mg

Excipiente q.s.p. 400,0 mg

Indicações:

Azicox-2 (200 mg) é um produto que associa um antibiótico bactericida do grupo dos macrolídeos - a Azitromicina - e um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2) - o Meloxicam.

A Azitromicina é um antibiótico moderno que apresenta, além de um amplo espectro de ação, características farmacocinéticas que permitem altas concentrações intracelulares e prolongada permanência nos tecidos, proporcionando, assim, resultados terapêuticos com um período mais curto de tratamento.

O Meloxicam bloqueia seletivamente a COX-2, proporcionando atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes efeitos, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a

destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos.

Azicox-2 (200 mg) proporciona antibioticoterapia de amplo espectro, combatendo a causa das infecções, enquanto trata a inflamação e seus efeitos.

Azicox-2 (200 mg) é indicado no tratamento de afecções respiratórias (causadas por *Bordetella* spp, *Chlamydia* spp, *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp, *Shigella* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*), pele e anexos (causadas por *Corynebacterium* spp, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp, *Pausterella multocida*), urogenitais (*Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*), digestivas (diarreias causadas por *Escherichia coli*), orais (gengivites e periodontites) e artrite séptica, osteomielite e discoespondilite (*Escherichia coli*). No pós-operatório de artroplastias, cirurgias ósseas, cirurgias ortodônticas, tratamentos ou profilaxias da doença periodontal e traumatismos em geral.

Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido de **Azicox-2 (200 mg)** na dosagem demonstrada na tabela abaixo, uma vez ao dia.

Azicox-2 (200 mg)	1º dia de tratamento 2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal*
	2º dia de tratamento em diante 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal**

*Dose equivalente a 20 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,2 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

**Dose equivalente a 10 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,1 mg/kg de peso corporal de Meloxicam.

Intervalo entre doses:

Azicox-2 (200 mg) deve ser administrado uma vez ao dia.

Duração do tratamento:

Para a maioria das afecções é recomendável três a cinco dias consecutivos de tratamento, podendo este período ser ajustado de acordo com o quadro clínico e orientação do médico-veterinário.

As piodermites profundas podem necessitar de um período maior de terapia.

Independente do quadro clínico o tratamento deverá ser realizado até 48 horas após o desaparecimento da sintomatologia clínica.

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite.

Interações medicamentosas e contraindicações:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides, ou após o tratamento com estas drogas. Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina ou a aspirina.

Não administrar com antiácidos.

A Azitromicina pode aumentar os níveis de carbamazepina, ciclosporina e digoxina por interferir no metabolismo destas substâncias.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.377/2008 em 07/03/08.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNP J: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

 **16 3518 2025**



50003282/0918 OPOO