

Top Dog[®]

USO VETERINÁRIO

Vermífugo palatável.

Fórmula:

Cada comprimido contém:

Apresentações

| Princípio ativo | 250 mg | 1000 mg | 3000 mg |
|---------------------|----------|---------|---------|
| Praziquantel | 12,5 mg | 50 mg | 150 mg |
| Pamoato de Pirantel | 36 mg | 144 mg | 432 mg |
| Febantel | 37,5 mg | 150 mg | 450 mg |
| Ivermectina | 0,015 mg | 0,06 mg | 0,18 mg |
| Excipiente q.s.p. | 250 mg | 1000 mg | 3000 mg |

Indicações:

Top Dog é um vermífugo palatável, indicado para o controle de parasitas internos (helmintos) com atuação em vermes redondos (nematódeos) e vermes chatos (cestódeos).

Top Dog é também indicado para o tratamento da Giardíase (causada pelo protozoário *Giardia sp.*). **Top Dog** é de uso exclusivo para cães.

Intervalo entre vermifugações:

O intervalo adequado entre as vermifugações varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores (pulgas) e necessidades estratégicas de vermifugação.

Os índices de eficácia do **Top Dog** podem sofrer influência de condições ambientais, fatores de resistência, índices de infestação e variações individuais do animal.

Quadro sugestivo de intervalo entre vermifugações:

| Idade ou situação do animal | Frequência de vermifugações |
|-----------------------------|---|
| Filhotes | Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias vermifugar mensalmente até o filhote completar seis meses de idade. |
| Machos e fêmeas adultos | Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com recomendação do médico-veterinário. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação. |

Tratamento da giardíase:

Realizar uma vermifugação diária durante três dias consecutivos.

Recomendações:

Para o maior sucesso das vermifugações recomendam-se algumas medidas de higiene, como: oferecer ao animal alimentos frescos e limpos e água clorada ou filtrada; manter o ambiente limpo, recolhendo as fezes e utilizando desinfetantes, como a amônia quaternária, medida imprescindível para o

Espectro de ação de Top Dog:

- **Nematódeos:** *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*.
- **Cestódeos:** *Dipylidium caninum*
- **Protozoários:** *Giardia sp.*

Modo de uso e dosagens:

- **Top Dog 2,5 kg (250 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 2,5 kg de peso corporal.
- **Top Dog 10,0 kg (1000 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 10 kg de peso corporal.
- **Top Dog 30,0 kg (3000 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 30 kg de peso corporal. Estas doses correspondem a 14,4 mg/kg de peso corporal de Pamoato de Pirantel; 5 mg/kg de peso corporal de Praziquantel; 15 mg/kg de peso corporal de Febantel e 0,006 mg/kg de peso corporal de Ivermectina.

sucesso do tratamento da giardíase que encontra na contaminação ambiental sua forma de reinfestação. Recomenda-se que, havendo cães contactantes com o cão tratado com **Top Dog**, seja realizada vermifugação em todos os animais no mesmo momento. Medidas de higiene ambiental como o recolhimento e descarte das fezes logo após a evacuação dos animais e limpeza do ambiente com produtos específicos diariamente são recomendadas para evitar a

recontaminação do animal tratado. Estas medidas devem ser reforçadas no momento do tratamento. Nos tratamentos de Giardíase, de forma específica, o ambiente atual como grande fator recontaminante e os cistos sofrem eliminação intermitente, portanto o cuidado com a higiene e limpeza do ambiente deve ser intenso durante um mês após o tratamento do animal.

Precauções:

Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Produto de uso veterinário, não administrar em humanos.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Interações medicamentosas:

A administração de **Top Dog** concomitante a outros produtos terapêuticos não foi avaliada quanto a possíveis interações medicamentosas.

Devido a um similar mecanismo de ação (e toxicidade), não é recomendado o uso de Pirantel concomitantemente ao uso de morantel ou levamisole.

Piperazina e Pirantel têm mecanismos de ação antagonistas, não utilizá-los juntos.

Contra-indicações e limitações de uso:

Não utilizar em filhotes com menos de duas semanas de idade. Não tratar animais extremamente debilitados.

A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes ou lactantes.

Efeitos colaterais:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. A intoxicação causada pela Ivermectina a determinados indivíduos das raças Collie, Pastores Australianos, Old English Sheepdogs, Pastores de Shetland e outras raças destes cruzamentos é passível de ocorrer apenas com doses de 0,1 a 0,2 mg/kg de peso, o que corresponde a aproximadamente 15 vezes a dose terapêutica de **Top Dog**, assegurando, assim, o uso do produto nestas raças.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis a algum dos componentes da fórmula.

Dados de toxicidade dos componentes de

Top Dog indicam uma ampla margem de segurança para o produto. Doses acima de 4 a 5 vezes a dose recomendada, porém, podem causar reações gastrointestinais em animais sensíveis.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Informações para uso Médico:

Grupo químico: Derivativo

Pirazinoisoquinolina/Tetraidropirimidina;

Ingrediente ativo: Praziquantel/ Pamoato de Pirantel;

Ação Tóxica: Atividade sobre as enzimas Na⁺/K⁺ ATPase e Ca²⁺/Mg²⁺ ATPase, aumentando a permeabilidade da membrana/Ação nicotínica na junção neuromuscular levando a uma paralisia espástica;

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 9.505 em 24/07/09.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.

KIT 50006069/12

Proprietário e Fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330 km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

www.ourofino.saudeanimal.com

Indústria Brasileira



50004408/1233-0150



Ouro SAC
16 3518 2025

Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



Enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Acesse reimagina.ourofino.com e conheça nossas iniciativas para garantir o equilíbrio sustentável da saúde animal ao bem-estar do mundo.



ourofino
saúde animal