

# Top Dog<sup>®</sup>

USO VETERINÁRIO

Vermífugo palatável.

## Fórmula:

Cada comprimido contém:

### Apresentações

Princípio ativo	250 mg	1000 mg	3000 mg
Praziquantel	12,5 mg	50 mg	150 mg
Pamoato de Pirantel	36 mg	144 mg	432 mg
Febantel	37,5 mg	150 mg	450 mg
Ivermectina	0,015 mg	0,06 mg	0,18 mg
Excipiente q.s.p.	250 mg	1000 mg	3000 mg

## Indicações:

**Top Dog** é um vermífugo palatável, indicado para o controle de parasitas internos (helmintos) com atuação em vermes redondos (nematódeos) e vermes chatos (cestódeos).

**Top Dog** é também indicado para o tratamento da Giardíase (causada pelo protozoário *Giardia sp.*). **Top Dog** é de uso exclusivo para cães.

## Intervalo entre vermifugações:

O intervalo adequado entre as vermifugações varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores (pulgas) e necessidades estratégicas de vermifugação.

Os índices de eficácia do **Top Dog** podem sofrer influência de condições ambientais, fatores de resistência, índices de infestação e variações individuais do animal.

## Quadro sugestivo de intervalo entre vermifugações:

Idade ou situação do animal	Frequência de vermifugações
Filhotes	Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias vermifugar mensalmente até o filhote completar seis meses de idade.
Machos e fêmeas adultos	Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com recomendação do médico-veterinário. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação.

## Tratamento da giardíase:

Realizar uma vermifugação diária durante três dias consecutivos.

## Recomendações:

Para o maior sucesso das vermifugações recomendam-se algumas medidas de higiene, como: oferecer ao animal alimentos frescos e limpos e água clorada ou filtrada; manter o ambiente limpo, recolhendo as fezes e utilizando desinfetantes, como a amônia quaternária, medida imprescindível para o

## Espectro de ação de Top Dog:

- **Nematódeos:** *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*.
- **Cestódeos:** *Dipylidium caninum*
- **Protozoários:** *Giardia sp.*

## Modo de uso e dosagens:

- **Top Dog 2,5 kg (250 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 2,5 kg de peso corporal.
  - **Top Dog 10,0 kg (1000 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 10 kg de peso corporal.
  - **Top Dog 30,0 kg (3000 mg):** Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 30 kg de peso corporal.
- Estas doses correspondem a 14,4 mg/kg de peso corporal de Pamoato de Pirantel; 5 mg/kg de peso corporal de Praziquantel; 15 mg/kg de peso corporal de Febantel e 0,006 mg/kg de peso corporal de Ivermectina.

sucesso do tratamento da giardíase que encontra na contaminação ambiental sua forma de reinfestação. Recomenda-se que, havendo cães contactantes com o cão tratado com **Top Dog**, seja realizada vermifugação em todos os animais no mesmo momento. Medidas de higiene ambiental como o recolhimento e descarte das fezes logo após a evacuação dos animais e limpeza do ambiente com produtos específicos diariamente são recomendadas para evitar a

recontaminação do animal tratado. Estas medidas devem ser reforçadas no momento do tratamento. Nos tratamentos de Giardíase, de forma específica, o ambiente atual como grande fator recontaminante e os cistos sofrem eliminação intermitente, portanto o cuidado com a higiene e limpeza do ambiente deve ser intenso durante um mês após o tratamento do animal.

#### Precauções:

Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Produto de uso veterinário, não administrar em humanos.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

#### Interações medicamentosas:

A administração de **Top Dog** concomitante a outros produtos terapêuticos não foi avaliada quanto a possíveis interações medicamentosas.

Devido a um similar mecanismo de ação (e toxicidade), não é recomendado o uso de Pirantel concomitantemente ao uso de morantel ou levamisole.

Piperazina e Pirantel têm mecanismos de ação antagonistas, não utilizá-los juntos.

#### Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar em filhotes com menos de duas semanas de idade. Não tratar animais extremamente debilitados.

A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes ou lactantes.

#### Efeitos colaterais:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. A intoxicação causada pela Ivermectina a determinados indivíduos das raças Collie, Pastores Australianos, Old English Sheepdogs, Pastores de Shetland e outras raças destes cruzamentos é passível de ocorrer apenas com doses de 0,1 a 0,2 mg/kg de peso, o que corresponde a aproximadamente 15 vezes a dose terapêutica de **Top Dog**, assegurando, assim, o uso do produto nestas raças.

#### Reações adversas:

Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis a algum dos componentes da fórmula.

Dados de toxicidade dos componentes de

**Top Dog** indicam uma ampla margem de segurança para o produto. Doses acima de 4 a 5 vezes a dose recomendada, porém, podem causar reações gastrointestinais em animais sensíveis.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

#### Informações para uso Médico:

**Grupo químico:** Derivativo

Pirazinoisoquinolina/Tetraidropirimidina;

**Ingrediente ativo:** Praziquantel/ Pamoato de Pirantel;

**Ação Tóxica:** Atividade sobre as enzimas Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATPase e Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup> ATPase, aumentando a permeabilidade da membrana/Ação nicotínica na junção neuromuscular levando a uma paralisia espástica;

**Antídoto/Tratamento:** Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000104 em 24/07/09.

#### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.

KIT 50007179/12

#### Proprietário e Fabricante:

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**

Rod. Anhanguera SP 330 km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

www.ourofino.saudeanimal.com

Indústria Brasileira



50007179/0925-0760



**Ouro SAC**  
**16 3518 2025**

Telefone ou WhatsApp  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



Enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Acesse [reimagina.ourofino.com](http://reimagina.ourofino.com) e conheça nossas iniciativas para garantir o equilíbrio sustentável da saúde animal ao bem-estar do mundo.



**ourofino**  
saúde animal