

# Herbalvet T.A.®

Uso Veterinário

Bactericida, fungicida e protozoaricida.

Fragrância herbal.

Elimina odores do ambiente.

Altamente concentrado.

Rende até 700 L.

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de Benzalcônio ..... 15,00 g

Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

## Indicações:

**HERBALVET T.A.** é indicado como desinfetante (bactericida, fungicida e protozoaricida) e desodorizante com propriedade tensoativa biodegradável e não corrosiva, para clínicas veterinárias, hospitais veterinários, canis, gatis, na limpeza e desinfecção de pisos, paredes, salas de banho e tosa, mesas de atendimento e de cirurgias e instrumentais cirúrgicos.

O produto possui ação efetiva contra as seguintes bactérias: *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa* e contra os seguintes fungos: *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus niger*. Também atua na inativação de cistos de *Giardia* spp.

## Farmacodinâmica:

A substância Cloreto de Benzalcônio é classificada como surfactante catiônico. É um composto químico que diminui a tensão superficial de uma solução aquosa, facilitando sua penetração em superfícies úmidas; forma emulsões com as secreções sebáceas contendo microbactérias,

o que facilita a remoção de sujidades e microbactérias com o processo de lavagem; remove da área contaminada as células epiteliais de descamação, manchas, graxa e gordura.

## Dosagem e Modo de uso:

Para uma correta desinfecção, é recomendada a remoção mecânica de toda a sujeira, seguida de lavagem com água e sabão; em seguida enxaguar para retirar todo o resíduo de sabão e deixar secar. Somente depois de limpo e seco é que se recomenda a aplicação do desinfetante.

**HERBALVET T.A.** deve ser diluído em água limpa, na dosagem de 1 mL do produto para 500 mL de água, ou seja, 10 mL em 5 litros de água e aplicado ou pulverizado em pisos, paredes, mesas, canis e gatis. Para lâminas de tosa e instrumentos cirúrgicos, lavar e enxaguar as peças e deixá-las imersas na solução do produto durante 20 minutos. Retirar as peças e secá-las totalmente. No caso de lâminas de tosa, realizar uma lubrificação após a secagem. Não necessita enxágue, pois o produto não é corrosivo. Quando o produto for utilizado para inativação de cistos de *Giardia* spp. também pode ser realizada a seguinte diluição: 1 mL do produto para 700 mL de água,

ou seja, 10 mL em 7 litros de água.

### **Precauções:**

Obedecer ao modo de uso e diluições preconizadas. Evitar o contato do produto com a pele e com os olhos, pois poderá causar irritação no local. Se isto ocorrer, lavar com água abundante por 15 minutos. Se a irritação persistir, procure auxílio médico, levando a embalagem do produto.

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procure auxílio médico imediato, levando a embalagem do produto. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

Utilizar EPI adequado (óculos, luvas, máscara e vestuário de proteção, como botas e avental de PVC) durante a manipulação e aplicação do produto.

Produto tóxico para peixes, não jogar em rios, lagos e outros cursos d'água.

Não utilizar o medicamento com data de validade vencida.

Não reutilizar embalagens vazias.

### **Contraindicações e limitações de uso:**

Não utilizar o produto puro, pois em contato com a pele e mucosas do homem e animais pode causar irritações.

Não usar junto com sabões e detergentes, pois os mesmos diminuem a atividade do desinfetante.

### **Reações adversas:**

O produto é seguro para aplicação no ambiente, conforme indicações e modo de usar preconizados. Entretanto relatos de literatura apontam a ocorrência de reações

adversas, quando em contato direto com o homem.

Há possibilidade de reações alérgicas em indivíduos hipersensíveis aos componentes do produto. Em concentrações mais elevadas, leves a graves queimaduras cáusticas podem ocorrer nos lábios, língua, boca, faringe, hipofaringe, esôfago e estômago.

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses. Após a diluição de 1:500, utilizar o produto em até 24 horas. Após a diluição 1:700, utilizar o produto imediatamente.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005.-1.000008.

### **Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

Proprietário e Fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofinosaudeanimal.com](http://www.ourofinosaudeanimal.com)  
Indústria Brasileira

 **16 3518 2025**



 **ourofino**  
saúde animal