

# Top Dog®

— Uso Veterinário

**Vermífugo palatável.**

## Fórmula:

Cada comprimido contém:

Princípio ativo	Apresentações		
	250 mg	1000 mg	3000 mg
Praziquantel	12,5 mg	50 mg	150 mg
Pamoato de Pirantel	36 mg	144 mg	432 mg
Febantel	37,5 mg	150 mg	450 mg
Ivermectina	0,015 mg	0,06 mg	0,18 mg
Excipiente q.s.p.	250 mg	1000 mg	3000 mg

## Indicações:

**Top Dog®** é um vermífugo palatável, indicado para o combate e controle de parasitas internos (helminthos) de cães com atuação em vermes redondos (nematódeos) e vermes chatos (cestódeos). **Top Dog®** é também indicado para o tratamento da Giardíase (causada pelo protozoário *Giardia* sp).

## Espectro de ação de Top Dog®:

### - Nematódeos

*Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*.

### - Cestódeos

*Dipylidium caninum*.

### - Protozoários

*Giardia* sp.

## Modo de uso e dosagens:

### - Top Dog® (250 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 2,5 kg de peso corporal.

### - Top Dog® (1000 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 10 kg de peso corporal.

### - Top Dog® (3000 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 30 kg de peso corporal.

Estas doses correspondem a 14,4 mg/kg de peso corporal de Pamoato de Pirantel; 5 mg/kg de peso corporal de Praziquantel; 15 mg/kg de peso corporal de Febantel e 0,006 mg/kg de peso corporal de Ivermectina.

## Intervalo entre vermifugações:

O intervalo adequado entre as vermifugações varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores (pulgas) e necessidades estratégicas de vermifugação.

## Quadro sugestivo de intervalo entre vermifugações:

Idade ou situação do animal	Frequência de vermifugações
Filhotes	Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias vermifugar mensalmente até o filhote completar seis meses de idade.
Machos e fêmeas adultos	Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com recomendação do médico-veterinário. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação.

## Tratamento da giardíase:

Realizar uma vermifugação diária durante três dias consecutivos.

### Precauções:

Para o maior sucesso das vermifugações recomendam-se algumas medidas de higiene, como: oferecer ao animal alimentos frescos e limpos e água clorada ou filtrada; manter o ambiente limpo, recolhendo as fezes e utilizando desinfetantes, como a amônia quaternária, medida imprescindível para o sucesso do tratamento da giardíase que encontra na contaminação ambiental sua forma de reinfestação.

### Interações medicamentosas:

Devido a um similar mecanismo de ação (e toxicidade), não é recomendado o uso de Pirantel concomitantemente ao uso de morantel ou levamisole. Piperazina e Pirantel têm mecanismos de ação antagonistas, não utilizá-los juntos.

### Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar em filhotes com menos de duas semanas de idade. Não tratar animais extremamente debilitados. A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes.

### Efeitos colaterais:

A intoxicação causada pela ivermectina a determinados indivíduos das raças Collie, Pastores Australianos, Old English Sheepdogs, Pastores de Shetland e outras raças destes cruzamentos é passível de ocorrer apenas com doses de 0,1 a 0,2 mg/kg de peso, o que corresponde a aproximadamente 15 vezes a dose terapêutica de **Top Dog**<sup>®</sup>, assegurando, assim, o uso do produto nestas raças.

### Reações adversas

Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis a algum dos componentes da fórmula. Dados de toxicidade dos componentes de

**Top Dog**<sup>®</sup> indicam uma ampla margem de segurança para o produto. Doses acima de 4 a 5 vezes a dose recomendada, porém, podem causar reações gastrointestinais em animais sensíveis.

Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

### Apresentações:

Cartucho contendo 1 blíster ou display contendo 12 blísteres com 4 comprimidos de 250 mg cada. Cartucho contendo 1 blíster ou display contendo 12 blísteres com 4 comprimidos de 1000 mg cada. Cartucho contendo 1 blíster ou display contendo 12 blísteres com 2 comprimidos de 3000 mg cada.

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.505 em 24/07/09.

### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817



**Proprietário e fabricante:**  
**Oufino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.oufinosaudeanimal.com](http://www.oufinosaudeanimal.com)  
Indústria brasileira

 16 3518 2025

