

Top Dog[®]

— Uso Veterinário

Vermífugo palatável.

Fórmula:

Cada comprimido contém:

| Princípio ativo | Apresentações | | |
|---------------------|---------------|---------|---------|
| | 250 mg | 1000 mg | 3000 mg |
| Praziquantel | 12,5 mg | 50 mg | 150 mg |
| Pamoato de Pirantel | 36 mg | 144 mg | 432 mg |
| Febantel | 37,5 mg | 150 mg | 450 mg |
| Ivermectina | 0,015 mg | 0,06 mg | 0,18 mg |
| Excipiente q.s.p. | 250 mg | 1000 mg | 3000 mg |

Indicações:

Top Dog é um vermífugo palatável, indicado para o combate e controle de parasitas internos (helmintos) de cães com atuação em vermes redondos (nematódeos) e vermes chatos (cestódeos). **Top Dog** é também indicado para o tratamento da Giardíase (causada pelo protozoário *Giardia* sp).

Espectro de ação de Top Dog:

- Nematódeos

Ancylostoma caninum, *Toxocara canis*.

- Cestódeos

Dipylidium caninum.

- Protozoários

Giardia sp.

Modo de uso e dosagens:

- Top Dog (250 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 2,5 kg de peso corporal.

- Top Dog (1000 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 10 kg de peso corporal.

- Top Dog (3000 mg)

Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 30 kg de peso corporal.

Estas doses correspondem a 14,4 mg/kg de peso corporal de Pamoato de Pirantel; 5 mg/kg de peso corporal de Praziquantel; 15 mg/kg de peso corporal de Febantel e 0,006 mg/kg de peso corporal de Ivermectina.

Intervalo entre vermifugações:

O intervalo adequado entre as

Quadro sugestivo de intervalo entre vermifugações:

| Idade ou situação do animal | Frequência de vermifugações |
|-----------------------------|--|
| Filhotes | Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias vermifugar mensalmente até o filhote completar seis meses de idade. |
| Machos e fêmeas adultos | Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com recomendação do médico-veterinário. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação. |

vermifugação varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores (pulgas) e necessidades estratégicas de vermifugação.

Tratamento da giardíase:

Realizar uma vermifugação diária durante três dias consecutivos.

Precauções:

Para o maior sucesso das vermifugações recomendam-se algumas medidas de higiene, como: oferecer ao animal alimentos frescos e limpos e água clorada ou filtrada; manter o ambiente limpo, recolhendo as fezes e utilizando desinfetantes, como a amônia quaternária, medida imprescindível para o sucesso do tratamento da giardíase que encontra na contaminação ambiental sua forma de reinfestação.

Interações medicamentosas:

Devido a um similar mecanismo de ação (e toxicidade), não é recomendado o uso de Pirantel concomitantemente ao uso de morantel ou levamisole. Piperazina e Pirantel têm mecanismos de ação antagonistas, não utilizá-los juntos.

Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar em filhotes com menos de duas semanas de idade.

Não tratar animais extremamente debilitados.

A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes.

Efeitos colaterais:

A intoxicação causada pela ivermectina a determinados indivíduos das raças Collie, Pastores Australianos, Old English Sheepdogs, Pastores de Shetland e outras raças

destes cruzamentos é passível de ocorrer apenas com doses de 0,1 a 0,2 mg/kg de peso, o que corresponde a aproximadamente 15 vezes a dose terapêutica de **Top Dog**, assegurando, assim, o uso do produto nestas raças.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis a algum dos componentes da fórmula. Dados de toxicidade dos componentes de **Top Dog** indicam uma ampla margem de segurança para o produto. Doses acima de 4 a 5 vezes a dose recomendada, porém, podem causar reações gastrintestinais em animais sensíveis.

Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.505 em 24/07/09.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

 16 3518 2025



5000354-0918 CFCO